

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用			
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置			
1	男 70代	狭心症 (リウマチ性 多発筋痛, 高血 圧, 脂質異常 症, 高脂血症)	75mg 7日間	後天性血友病			
				投与 12 日前	労作時胸痛を主訴に当院受診。MDCT にて LAD の高度狭窄を認めた。		
				投与 1 日前	再診。		
				投与開始日	本剤 75mg/日, アスピリン, ランソプラゾールの内服開始。		
				投与 4 日目	左眼瞼周囲と右上腕に皮下出血を認めた。		
				投与 7 日目 (投与中止日)	冠動脈造影のため, 当院入院。入院時, 左眼瞼周囲及び右上腕に皮下出血を認めた。予定通り冠動脈造影検査を施行した(右 RA アプローチ)。LAD# 7 に 90%狭窄あり IVUS にて病変観察後に DES を 1 つ (Nobori 3.5-14mm) 留置。良好なステント拡張を得て手技を終了。PCI 後右前腕, 右大腿, 左前腕などに新たな皮下出血を認めるも穿刺部の止血は確認。		
				中止 1 日後	穿刺部の止血は確認できたが, 全身の皮下出血は改善せず。本剤のハイレスポンダーを否定できないことから本剤をシロスタゾールに変更するも改善なし。退院。静脈性の出血止まらず。 夜: さらに皮下出血増大を認めたため再来院。経過観察目的にて再入院。シロスタゾールを中止。		
				中止 3 日後	FFP 投与するも改善なし。		
中止 5 日後	第Ⅷ因子凝固活性低下及び第Ⅷ因子インヒビターの上昇を認め, 後天性血友病と診断。(クロスミキシング試験は行わず)。 転院し血漿交換, ステロイドパルスを施行。						
日付不明	免疫抑制剤とステロイド, 第Ⅷ→Ⅶ因子製剤を投与。 治療目的にて他院血液内科に転院。 内科的治療により皮下出血は消失し退院。 抗血小板剤はアスピリン単剤のみであるが現在まで心血管イベントは認めていない。						
臨床検査値							
				投与 1 日前	中止 2 日後	中止 3 日後	中止 5 日後
APTT (sec)				—	72.4	—	—
PT・INR				—	0.92	—	—
PLT (×10 ⁴ /mm ³)				24.9	26.0	24.0	23.4
併用薬: アスピリン(併用被疑薬), ランソプラゾール(併用被疑薬), チアミンジスルフィド・B ₆ ・B ₁₂ , アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物, ロラゼパム, リマプロスト アルファデクス, メチルプレドニゾン							

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用				
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置				
2	男 70代	ラクナ梗塞 (心不全, 不整脈, 心房細動)	75mg (371日間) ↓ 中止 ↓ 75mg (12日間)	好酸球性肺炎				
				投与開始日	MRI でラクナ梗塞指摘あり, 本剤 75mg/日投与開始。			
				投与 251 日目	ふらつきに対して, 脳血管障害疑われ, 近医でシロスタゾール OD 200mg/日投与開始。			
				投与 316 日目	心房細動に対してジソピラミド 300mg/日投与開始。			
				投与 357 日目	CXP で左下肺野にわずかに網状影出現。			
				投与 371 日目 (投与中止日)	血痰を認めたため, 本剤, シロスタゾール OD 中止。 夜間の発熱と発汗も認めた。			
				中止 13 日後	呼吸器内科初診時には症状改善。			
				再投与開始日	近医の指示で両薬剤(本剤 75mg/日, シロスタゾール OD)再開。その後夜間の発熱, 発汗再燃。			
				再投与 12 日目 (再投与中止日)	肺炎疑いで緊急入院。セフトリアキソン及びアジスロマイシンによる治療と共に内服薬中止(本剤, ジソピラミド投与中止)。			
				中止 2 日後	DLST 検査で本剤: 陽性(シロスタゾール OD: 陰性)。			
				中止 5 日後	BF 施行し, 右上葉で BAL 施行。好酸球優位の BAL 所見, TBLB でもリンパ球, 好酸球の浸潤を認めた(好中球: 36%, 好酸球: 24%, 好塩基球: 1.9%, リンパ球: 28.4%, 単球: 1.4%)。			
				中止 30 日後	肺炎像, 症状は両薬剤中止及び抗生剤投与(セフトリアキソン, アジスロマイシン)で速やかに改善。転帰: 軽快。			
日付不明	ステロイドによる治療は行わずに陰影改善したため退院。							
臨床検査値								
			投与 36 日目	投与 166 日目	投与 357 日目	中止 5 日後	再投与 2 日目	再投与中止 30 日後
白血球数 (/mm ³)			6,320	6,380	9,450	17,760	6,270	7,150
リンパ球 (%)			41.1	47.5	—	16.0	35.6	42.4
好酸球 (%)			10.1	10.3	—	0.8	4.3	12.2
好中球 (%)			38.5	30.9	—	77.0	48.3	33.0
好塩基球 (%)			0.6	1.1	—	0.2	1.1	0.8
CRP (mg/dL)			<0.25	<0.25	—	—	<0.25	—
IgE (IU/mL)			—	—	—	932	—	—
併用薬: ジソピラミド(併用被疑薬), シロスタゾール(併用被疑薬), アテノロール(併用被疑薬), ペラパミル塩酸塩(併用被疑薬), セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物, セチリジン塩酸塩, エピナスチン塩酸塩								